

Uniwersytecki Biuletyn **Meteorologiczny**

Borucino

Kościerzyna

Ostrzyce

Nr 84 (132) Marzec 2017

ISSN 2081-884X

KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII
Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

fot. M.Owczarek

Od Redakcji:

Opracowanie i publikację warunków meteorologicznych na stacjach kaszubskich, z inicjatywy prof. M. Miętusa, kierownika Katedry Meteorologii i Klimatologii (KMik) Uniwersytetu Gdańskiego, zapoczątkował dr J. Filipiak w czerwcu 2006 r. Początkowo porównywane były dane ze stacji Borucino i Ostrzyce (Złota Góra). W styczniu 2007 r. do analiz włączono kolejną stację kaszubską - Kościerzyna.

Począwszy od stycznia 2009 r. analizy prowadzone były przez dr. A. Wyszowskiego. Od maja 2010 r. wyniki ukazują się w postaci „Uniwersyteckiego Biuletynu Meteorologicznego”. Począwszy od lipca 2010 r. oprócz analiz porównawczych w Biuletynie zamieszczana jest ogólna ocena warunków meteorologicznych w Borucinie w danym miesiącu, opracowywana przez dr. M. Marosza. Od stycznia 2011 r. zamieszczane są wykresy przebiegu zachmurzenia i usłonecznienia. Od roku 2014 zamieszczane są wyniki pomiarów pionowego profilu temperatury powietrza i temperatury gruntu oraz promieniowania ultrafioletowego (UV-A i UV-B) i aktywnego fotosyntetycznie (PAR).

Publikowanie są również charakterystyki roczne warunków meteorologicznych Borucina. Pierwszy Biuletyn z tej serii nosił numer 31 (80) i dotyczył roku 2012.

Wszystkie dotychczasowe opracowania są dostępne w formacie .pdf, na stronie domowej Katedry:

http://www.klimat.ug.edu.pl/?page_id=493

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Adres redakcji: Katedra Meteorologii i Klimatologii

Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

80-958 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, B-326

tel. 58-523-65-24, e-mail: klimat@ug.gda.pl

Redaktor naczelna: Małgorzata Owczarek (m.owczarek@ug.edu.pl)

Redakcja: Krzysztof Wiejak (klimat@ug.edu.pl)

Michał Marosz (m.marosz@ug.edu.pl)

Projekt graficzny: Andrzej Wyszowski

Skład: Krzysztof Wiejak


Wydawca: Katedra Meteorologii i Klimatologii IG UG

Rozmieszczenie stacji meteorologicznych	4
Nowoczesne przyrządy pomiarowe w Borucinie.....	5
Ogólna ocena warunków meteorologicznych w Borucinie w marcu 2017	8
Natężenie promieniowania całkowitego.....	9
Natężenie promieniowania ultrafioletowego.....	11
Sumy dobowe energii promieniowania całkowitego i odbitego	12
Sumy dobowe energii promieniowania długofalowego.....	12
Sumy dobowe energii promieniowania bezpośredniego i rozproszonego	13
Sumy dobowe promieniowania aktywnego fotosyntetycznie.....	13
Sumy miesięczne promieniowania	14
Średnie dobowe zachmurzenie ogólne.....	14
Sumy dobowe usłonecznienia rzeczywistego.....	14
Charakterystyka porównawcza przebiegu elementów meteorologicznych – Borucino, Kościerzyna i Ostrzyce (Złota Góra)	15
Charakterystyka porównawcza ekstremalnych wartości elementów meteorologicznych – Borucino, Kościerzyna i Ostrzyce (Złota Góra)	
Zmienność czasowa temperatury powietrza (2 m)	17
Zmienność czasowa temperatury powietrza przy gruncie	19
Zmienność czasowa wilgotności względnej powietrza.....	21
Zmienność czasowa średniej prędkości wiatru	23
Zmienność czasowa maksymalnej prędkości wiatru	25
Różnice kierunkowe - prędkościowe wiatru	26
Prędkość wiatru – składowa pionowa.....	28
Prędkość wiatru mierzona wiatromierzami sonicznymi.....	28
Średnia miesięczna prędkość wiatru.....	29
Sumy dobowe i miesięczne opadu atmosferycznego	30
Grubość pokrywy śnieżnej.....	31
Odchylenia standardowe temperatury powietrza (2 m)	32
Odchylenia standardowe temperatury powietrza przy gruncie	32

Spis treści:

Odchylenia standardowe wilgotności względnej powietrza	33
Odchylenia standardowe średniej prędkości wiatru	33
Profil pionowy temperatury powietrza	34
Temperatura gruntu	35

ROZMIESZCZENIE STACJI METEOROLOGICZNYCH



BORUCINO

szerokość geogr.	54°15'N
długość geogr.	17°59'E
wysokość n.p.m.	163 m
właściciel stacji	UG

KOŚCIERZYNA

szerokość geogr.	54°08'N
długość geogr.	17°58'E
wysokość n.p.m.	190 m
właściciel stacji	IMGW PIB

OSTRZYCE (Złota Góra)

szerokość geogr.	54°16'N
długość geogr.	18°06'E
wysokość n.p.m.	224 m
właściciel stacji	IMGW PIB

Źródło: Mapy Google, opracował: A. Wyszowski,

NOWOCZESNE PRZYRZĄDY POMIAROWE W BORUCINE

PRZYRZĄDY		POMIARY
PLATFORMA SUN TRACKER SOLYS 2 KIPP&ZONEN		
	Pyrheliometr SHP-1	od listopada 2014 r. pomiar promieniowania bezpośredniego
	Pyranometr SMP-11	od listopada 2014 r. pomiar promieniowania rozproszonego
 fot. S. Skierka	Fitofotometr PQS-1 PAR Quantum Sensor	od listopada 2014 r. pomiar promieniowania aktywnego fotosyntetycznego
	Czujnik UV-S-AB-T	od grudnia 2013 r. pomiar promieniowania UV-A i UV-B

NOWOCZESNE PRZYRZĄDY POMIAROWE W BORUCINE

PRZYRZĄDY	POMIARY
	<i>od września 2014 r. pomiary usłonecznienia</i>
	<i>od grudnia 2013 r. pomiary temperatury gruntu (gł. 5, 10, 20, 50, 100 cm)</i>
	<i>od lipca 2016 r. pomiary kierunku i prędkości wiatru (wys. 0,63 m) wraz ze składową pionową</i>

NOWOCZESNE PRZYRZĄDY POMIAROWE W BORUCINE



Zestaw czujników
gradientowych

*od listopada 2013 r.
pomiaru temperatury i wilgotności
(wys. 5, 10, 50, 100, 150, 200, 500, 1000, 1200 cm)*

OGÓLNA OCENA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W BORUCINE - MARZEC 2017

TEMPERATURA POWIETRZA

Średnia miesięczna temperatura powietrza w marcu wyniosła 4,1°C. Stosując kryteria klasyfikacji kwantylowej warunków termicznych (Miętus i in., 2002), marzec był miesiącem ciepłym. Najwyższe wartości średniej dobowej temperatury powietrza (t_{dsr}) zostały zanotowane w trzeciej dekadzie miesiąca i przekraczały 5°C. Najwyższą wartość t_{dsr} zanotowano 31.03 (12,5°C). Najniższe wartości t_{dsr} wystąpiła 7.03 (-0,4°C). W przebiegu maksymalnej dobowej temperatury powietrza zanotowano maksimum: 17,4 °C (31.03) oraz minimum 1,2°C (7.03). Wartości temperatury minimalnej wahały się od -3,0°C (14.03) do 6,9°C (31.03).

OPADY ATMOSFERYCZNE



Miesięczna suma opadów wyniosła 39,2mm. Na tle wielolecia marzec był miesiącem NORMALNYM - według kwantylowej klasyfikacji opadowej (Miętus i in., 2005). Odnotowano 14 dni z opadem atmosferycznym. Najwyższą dobową sumę opadu zarejestrowano 19.03 i wyniosła ona 8,4mm. W siedmiu przypadkach suma dobowa nie przekroczyła 1mm.


PRĘDKOŚĆ I KIERUNEK WIATRU

Struktura kierunkowa wiatru jest charakterystyczna dla stacji zlokalizowanych w dnach rynien polodowcowych i wskazuje na znaczną dominację kierunków zgodnych z osią jeziora tj. SW-NE. W lutym zaobserwowano przewagę udziału kierunków z sektora SW (WSW, SW, SSW - łącznie 67,4% przypadków) względem NE (NNE, NE, ENE - łącznie 16,3% przypadków). Średnia miesięczna prędkość wiatru w marcu wynosiła 2,2 ms⁻¹ a najwyższą średnią wartość dobową zanotowano 15 marca (4,6 ms⁻¹). Maksymalną prędkość wiatru (poryw) zarejestrowano 15.03 i wyniosła ona 14,4 ms⁻¹.


NATĘŻENIE PROMIENIOWANIA CAŁKOWITEGO [$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$] (BORUCINO)

Wykresy wygenerowane przy użyciu programu LAB-EL LBX







NATĘŻENIE PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO [$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$] (BORUCINO)




SUMY DOBOWE ENERGII PROMIENIOWANIA [$\text{MJ} \cdot \text{m}^{-2}$] (BORUCINO)




SUMY DOBOWE ENERGII PROMIENIOWANIA (BORUCINO)

Sumy dobowe energii promieniowania bezpośredniego i rozproszonego [$\text{MJ} \cdot \text{m}^{-2}$]





Sumy promieniowania fotosyntetycznie aktywnego [$\text{mol} \cdot \text{m}^{-2}$]



SUMY MIESIĘCZNE PROMIENIOWANIA (BORUCINO)

K↓ [MJ·m ⁻²]	K↑ [MJ·m ⁻²]	L↓ [MJ·m ⁻²]	L↑ [MJ·m ⁻²]	Bezpośrednie [MJ·m ⁻²]	Rozproszone [MJ·m ⁻²]	PAR ↓ [mol·m ⁻²]	PAR ↑ [mol·m ⁻²]
248,4	57,0	895,4	820,6	203,2	138,6	45,0	4,6

ZACHMURZENIE OGÓLNE I USŁONECZNIE NIE RZECZYWISTE (BORUCINO)



Długość dnia najkrótszego: 10 h 43'

Długość dnia najdłuższego: 12 h 47'





CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZAPRZEBIEGU ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH NA STACJACH W BORUCINIE ORAZ KOŚCIERZYNIE I OSTRZYCACH (Złota Góra)

Element	Wskaźnik	Ostrzyce	Borucino	Kościerzyna
Temperatura powietrza [°C]	Średnia	4,4	4,4	4,1
	Odchylenie standardowe	2,9	3,0	2,7
	Współczynnik korelacji	0,98		0,99
Temperatura powietrza przy powierzchni gruntu [°C]	Średnia	4,0	4,2	4,1
	Odchylenie standardowe	2,8	2,9	2,8
	Współczynnik korelacji	0,97		0,97
Wilgotność względna [%]	Średnia	80,8	81,4	84,2
	Odchylenie standardowe	9,6	10,4	9,2
	Współczynnik korelacji	0,99		1
Prędkość średnia wiatru [$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$]	Średnia	3,4	2,2	2,2
	Odchylenie standardowe	1,5	0,7	1,0
	Współczynnik korelacji	0,81		0,79
Prędkość średnia maksymalna wiatru [$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$]		5,4	4,1	-
Opady atmosferyczne [mm] – suma miesięczna		27,6	39,2	36,7





**CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA EKSTREMALNYCH WARTOŚCI
ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH NA STACJACH
W BORUCINIE ORAZ KOŚCIERZYNIE I OSTRZYCACH (Złota Góra)**

Element		Ostrzyce	Borucino	Kościerzyna
Opady [mm]	Maksimum dobowe	7,2 (18.03)	8,4 (20.03)	8,5 (20.03)
Temperatura powietrza [°C]	Minimum	-2,3 (13.03)	-3,0 (13.03)	-3,0 (13.03)
	Maksimum	18,2 (31.03)	17,3 (31.03)	19,3 (31.03)
Prędkość wiatru [$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$]	Maksimum	11,3 (15.03)	8,1 (18.03)	6,6 (18.03)





TEMPERATURA POWIETRZA [°C] (BORUCINO I OSTRZYCE)







TEMPERATURA POWIETRZA [°C] (BORUCINO I KOŚCIERZYNA)







TEMPERATURA POWIETRZA PRZY POWIERZCHNI GRUNTU [°C] (BORUCINO I OSTRZYCE)







TEMPERATURA PRZY POWIERZCHNI GRUNTU [°C] (BORUCINO I KOŚCIERZYNA)







WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA [%] (BORUCINO I OSTRZYCE)







WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA [%] (BORUCINO I KOŚCIERZYNA)







PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA WIATRU [$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$] (BORUCINO I OSTRZYCE)



PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA WIATRU [$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$] (BORUCINO I KOŚCIERZYNA)




PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA WIATRU [$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$] (BORUCINO I OSTRZYCE)




KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU - CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA (BORUCINO I OSTRZYCE)

Borucino




Ostrzyce




KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU - CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA (BORUCINO i KOŚCIERZYNA)



Borucino




Kościerzyna



SKŁADOWA PIONOWA I PRĘDKOŚĆ WIATRU [$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$] (BORUCINO)




ŚREDNIA MIESIĘCZNA PRĘDKOŚĆ WIATRU [$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$] (BORUCINO)




Wysokość [m]	Odchylenie standardowe
16,25	1,61
10	1,48
2	1,22
0,75	1,04

Pomiary wykonano za pomocą urządzeń: Gill Windmaster 3D (0,63m), Milos500 (10m), Vaisala WS-425 (2m i 16,25m)





SUMY DOBOWE OPADÓW (BORUCINO, OSTRZYCE, KOŚCIERZYNA)







POKRYWA ŚNIEŻNA (BORUCINO)




ODCHYLENIE STANDARDOWE



ODCHYLENIE STANDARDOWE





PROFIL PIONOWY TEMPERATURY POWIETRZA (BORUCINO)



Wysokość pomiaru (m)	12,0	10,0	5,0	2,0	1,5	1,0	0,50	0,10	0,05
Temperatura średnia miesięczna (°C)	4,1	4,3	4,4	4,3	4,2	4,3	4,2	4,3	4,2

TEMPERATURA GRUNTU [°C](BORUCINO)



Głębokość pomiaru	5 cm	10 cm	20 cm	50 cm	100 cm
Temperatura średnia miesięczna [°C]	4,3	4,2	4,1	4,0	4,2



fot. A.Wyszkowski, S. Skierka